



Bacterina y Toxoide

Ficha Técnica

BACT 7 TONG (Bacterinas anaerobias)

DESCRIPCIÓN:

Las enfermedades provocadas por clostridios afectan al ganado en forma repentina, causando muertes, incluso antes de que puedan observarse síntomas clínicos. Estas bacterias crean esporas muy resistentes que se mantienen latentes por años en el medio ambiente y forman parte de la flora habitual de los rumiantes. Cualquier cambio brusco en la alimentación o situaciones de stress pueden desencadenar la infección, siendo los resultados económicos devastadores para el ganadero. **BACT 7 TONG** es una bacterina para uso en bovinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos y caballos jóvenes; elaborada con cepas nacionales de *Clostridium chauvoei*, *Clostridium septicum*, *Clostridium perfringens B, C y D*, *Clostridium Novyi tipo B* y *Clostridium Sordellii* inactivadas y con adyuvante oleoso; que garantiza el 100% de efectividad contra las principales enfermedades que afectan la ganadería peruana como son el Carunco Sintomático o pierna negra, el Edema Maligno o gangrena gaseosa, Enterotoxemia, Hepatitis Necrótica y Enteritis necrótica.

VENTAJAS:

- Contiene cepas que son originales de aislamientos a campo.
- Su adyuvante permite una prolongada duración de la inmunidad.
- No produce reacciones en el punto de aplicación.
- Puede ser aplicada en forma simultánea con otras vacunas ya que no se producen interferencias cruzadas.
- Reune todos los controles de calidad exigidos por la autoridad sanitaria de potencia, inocuidad y esterilidad, Certificado y Validado por el SENASA.

COMPOSICIÓN:

Cultivos puros de *Clostridium chauvoei* 40 %, de *Clostridium septicum* 10 % y de *Clostridium perfringens Tipos B, C y D* 30 %, *Clostridium Novyi Tipo B* 10%, *Clostridium Sordellii* 10 %, Adyuvante oleoso.

INDICACIONES:

BACT 7 TONG está indicado en la prevención y control de Carunco Sintomático o pierna negra, Edema Maligno o gangrena gaseosa, Enterotoxemia y Hepatitis Necrótica en bovinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos y caballos jóvenes.

ADMINISTRACIÓN:

Administrar BACT 7 TONG por vía subcutánea.

DOSIS:

- **Bovinos:** 5 mL
- **Ovinos y demás:** 3 mL

DURACIÓN DE LA INMUNIDAD:

La inmunidad se establece a los 15 días de aplicada la vacuna y dura aproximadamente 12 meses. Sin embargo, en zonas endémicas o donde la enfermedad es prevalente, deberá revacunarse cada 6 meses.

PRECAUCIONES:

- Animales enfermos, desnutridos o en estado febril no deben vacunarse.
- Utilizar siempre material estéril (agujas y jeringas).
- El envase junto con los restos de vacuna deben quemarse completamente.
- Consérvese en refrigeración entre 3 y 8° C.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIONES:

Frasco ampolla de 50, 100 y 250 mL

