



Quimioterápico

Ficha Técnica

ANTIPAPILOMA TONG Solución Inyectable

Reg. Senasa F.67.01.N.0007

DESCRIPCIÓN:	ANTIPAPILOMA TONG® compuesto por Clorobutanol; altera el metabolismo del virus causante de la papilomatosis, impidiendo su crecimiento. ANTIPAPILOMA TONG® también tiene un alto poder antiséptico y anestésico local haciendo que su aplicación sea indolora. Después de la aplicación las verrugas desaparecen en un espacio de tiempo que varía entre 15 a 60 días sin dejar cicatrices y sin aparecer recidivas.
COMPOSICIÓN:	Cada 100 mL contiene: Clorobutanol 25 g., Excipientes c.s.p. 100 ml.
INDICACIONES:	ANTIPAPILOMA TONG® está indicado en el tratamiento de Papilomatosis (verrugas) de bovinos, ovinos, caprinos y caninos.
ADMINISTRACIÓN Y DOSIS:	<ul style="list-style-type: none">- Bovinos: aplicar por vía subcutánea de 5 a 20 mL de ANTIPAPILOMA TONG® por cada 100 Kg de peso, dependiendo de la gravedad del caso y criterio del veterinario.- Terneros, Ovinos, Caprinos y Caninos: aplicar por vía subcutánea 1 mL de ANTIPAPILOMA TONG® por cada 10 Kg de peso.- En papilomas de mama y verrugas de pequeño tamaño: aplicar ANTIPAPILOMA TONG® por vía tópica; directamente a la verruga y diariamente con la ayuda de un pincel. Esta aplicación tópica debe abarcar un área un mayor alrededor del papiloma para aumentar la superficie de absorción.- En verrugas gigantes deberá repetirse la aplicación de ANTIPAPILOMA TONG® luego de 10 días.
CONTRAINDICACIONES:	<ul style="list-style-type: none">- El producto está contraindicado en animales que presenten estados de caquexia o desnutrición o con compromiso de las funciones renal y/o hepática.- En animales anémicos e hipoproteinéuticos.- No aplicar más que 10 ml por punto de aplicación subcutánea.- Nunca utilizar algodón o gasa embebida de la solución de ANTIPAPILOMA TONG®, ya que podría provocar una fuerte irritación del tejido cutáneo abajo de la compresa.
EFFECTOS COLATERALES:	Eventualmente el producto puede ocasionar reacciones locales inflamatorias, en el punto de aplicación.
RESTRICCIONES:	<ul style="list-style-type: none">- Hembras Preñadas: No utilizar ANTIPAPILOMA TONG® en dosis elevadas, pues la placenta es permeable al Clorobutanol pudiendo ocasionar hipnosis al feto.
PERIODO DE RETIRO:	Carne y leche: 72 horas.
RECOMENDACIONES:	<ul style="list-style-type: none">- Conservar el producto fuera del alcance de los niños.- Conservar el producto en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa.-
PRESENTACIONES:	Frascos de 10y 20 mL

