BIOTONG

Minerales

Ficha Técnica

CALCIVITONG® FORTE Solución Inyectable

Reg. Senasa F.F4.01.N.0119

DESCRIPCIÓN:

CALCIVITONG® FORTE es una solución estéril inyectable de calcio adicionado con cobalto, fósforo, vitaminas de acción prolongada y minerales para restaurar el correcto equilibrio del organismo. Su fórmula está balanceada para asegurar concentraciones sanguíneas adecuadas de calcio, fósforo, magnesio, vitaminas y minerales. CALCIVITONG® FORTE es una fuente insustituible de elementos necesarios para el desarrollo sano y vigoroso del animal. El Cobalto presente en su formulación es indispensable para la síntesis microbiana de vitamina B12, factor de crecimiento y de acción antianémica, pues se requiere para la formación de glóbulos rojos.

COMPOSICIÓN:

Cada 100 ml contiene:
Cloruro de Calcio 3.6 mEq., Cobalto 6 mg., Vitamina A 2000000 UI, Vitamina B1 0.03 mg., Vitamina B2 0.15 mg., Vitamina B12 6 mg., Vitamina C 5 mg., Vitamina D3 1000000 UI, Vitamina E 500 mg., Fósforo 70 mg., Magnesio 8.5 mg., Zinc 0.3 mg., Sodio 43 mg., Potasio 147 mg., Excipiente c.s.p. 100 ml.

INDICACIONES:

CALCIVITONG® FORTE es un reconstituyente vitamínico y mineral para Bovinos, Ovinos, Caprinos, Equinos, Porcinos y Caninos en:

- -La prevención y tratamiento de enfermedades metabólicas provocadas por deficiencia de los componentes de su fórmula
- -El tratamiento de hipocalcemia, raquitismo, osteomalacia, desnutrición
- -Para calcificar a los animales durante la gestación y lactancia, en la tetania de los pastos, hemorragias y rehabilitación post-operatoria del hueso
- -El rápido restablecimiento de animales convalecientes que han sufrido procesos infecciosos agudos y crónicos
- -Animales sometidos a esfuerzos intensos, estados de estrés en general
- -Choque o deshidratación
- -Terapia de apoyo en casos de diarreas severas y vómito.

ADMINISTRACIÓN:

Administrar CALCIVITONG® FORTE por vía intramuscular profunda.

DOSIS:

Especie	Dosis Preventiva	Dosis Curativa	Frecuencia
Bovinos y Equinos	10 – 20 mL	10 – 20 mL	Cada 2 días
Porcinos y menores	0.5 mL	1 – 2 mL	Cada 24 horas

RECOMENDACIONES:

- Agítese bien antes de usar.
- Administrarse a la temperatura corporal y lentamente.
- Conservar el producto fuera del alcance de los niños.
- Conservar el producto en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa.

PRESENTACIONES:

Frascos de 20, 50, 100 y 250 ml.