BIOTONG

Antiparasitario Externo

Ficha Técnica

CIPRO TONG® Emulsión

Reg. Senasa F.07.46.N.0472

DESCRIPCIÓN:	CIPRO TONG® Solución emulsionable, es un antiparasitario de uso externo externo, efectivo en el control de insectos y ácaros en animales domésticos. Su principio activo, la Cipermetrina que pertenece al grupo de los piretroides; actúa sobre el sistema nervioso central de los insectos y acaros causando hiperactividad, falta de coordinación y dificultad para el movimiento, temblor, convulsión y parálisis;
COMPOSICIÓN:	Cada 100 mL contiene: Cipermetrina 10 g., Excipientes c.s.p. 100 ml.
INDICACIONES:	CIPROTONG® posee actividad contra parásitos externos como garrapatas (Boophilus Microplus), mosca de los establos (Stomoxys calcitrans), mosca de los cuernos (Haematobia irritans), gusanera o miasis (Dermatobia hominis), mosca común, ácaros de la sarna (Sarcoptes scabiei var. Bovis, Sarcoptes scabiei var. suis, Chorioptes bovis y Psoroptes ovis), escarabajo negro (Alphitobium diaperimus), piojos (Linognatus vituli, Heamatopirus euristernus, Damalinia bovis, Solenoptes capilatus, Calumbicola spp, Cuclotogarter spp, Goniolotes spp, Goniodes spp, Holomenopon spp, Lipeurus spp, Manacanthus spp, Menopon spp) de los bovinos, ovinos, caprinos, camélidos, porcinos, cerdos, equinos; así también para la fumigación de galpones avícolas.
ADMINISTRACIÓN:	Aplicar CIPRO TONG® en baños de aspersión o inmersión.
DOSIS:	- **En baños de aspersión:** Diluir 20 mL de CIPRO TONG® en 20 litros de agua. Utilizar 3 a 4 litros por animal - **En baños de inmersión:** Diluir 1 litro de CIPRO TONG® en 1000 litros de agua, mantener el animal por 15 minutos como mínimo. Repetir el baño cada 7 días.
TIEMPO DE RETIRO:	- Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 48 horas después de finalizado el tratamiento. - La leche producida durante el tratamiento y 48 horas después de terminado el mismo, no debe darse para consumo humano.
RECOMENDACIONES:	- CIPRO TONG® debe ser aplicado con elementos de seguridad como guantes, mameluco, gorro, gafas y botas de caucho. - No exponerse, ni respirar la neblina y vapores de aspersión. - Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa de calle. - Es tóxico si se ingiere. No comer, beber, ni fumar durante su manejo y aplicación. - No transportarse con alimentos, bebidas o medicamentos de uso humano y/o animal. - No contaminar fuentes de agua ni con el roció ni con la aspersión. - En caso de intoxicación del animal llamar al médico veterinario. - Después de usar el contenido, enjuagar 3 veces el envase y verter el agua de lavado en la mezcla de aplicación, luego destruir el envase triturándolo. - Conservar el producto fuera del alcance de los niños. - Conservar el producto en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa.
PRESENTACIONES:	Frasco 10 y 20 mL