BIOTONG

Antiparasitario Interno

Ficha Técnica

COMBATONG® 25% Suspensión Oral

Reg. Senasa F.08.32.N.1044

DESCRIPCIÓN:

COMBATONG® 25% es un antiparasitario de amplio espectro para bovinos, camélidos, ovinos y caprinos a base de Albendazol micronizado para ser administrado vía oral. COMBATONG® 25% pertenece a la familia de los benzimidazoles; su acción se extiende a las principales parasitosis de los rumiantes, es decir, nematodos gastrointestinales y pulmonares, cestodos (tenias) y trematodos (Fasciola hepática - forma adultas), incluyendo larvas hipobióticas y huevos. Actúa, por lo tanto, en las 3 etapas del ciclo de vida de los parásitos. COMBATONG® 25% ejerce su actividad al bloquear la absorción de la glucosa por los parásitos, como fuente de energía necesaria para su supervivencia.

Indicaciones
Profilaxis y tratamiento de las parasitosis internas, provocadas por las formas adultas e inmaduras de los gusanos redondos gastrointestinales y pulmonares (nematodos), tenias (cestodos) y formas adultas de Fasciola hepática.

COMPOSICIÓN:

Cada 100 mL contiene:
Albendazole micronizado 25 g., Sulfato de Cobalto 0.975 mg., Excipientes c.s.p. 100 ml.

INDICACIONES:

COMBATONG® esta indicado para el tratamiento y control de las parasitosis internas de bovinos, camélidos sudamericanos, caprinos y ovinos ocasionadas por:

- **Parásitos gastrointestinales:**
  - Formas maduras e inmaduras de: Cooperia spp., Ostertagia spp., Haemonchus spp., Trichostrongylus spp., Capillaria spp., Strongyloides spp., Nematodirus spp. y Chabertia ovina. Larvas enquistadas de Ostertagia spp. tipo II.
  - Formas adultas de: Oesophagostomum radiatum, Bunostomum phlebotomun
- **Parásitos pulmonares:** Formas adultas e inmaduras de Dictyocaulus spp.
- **Céstodos (Tenias):** Moniezia expansa y Moniezia benedeni
- **Trematodos:** Formas adultas de: Fasciola hepática

ADMINISTRACIÓN:

Administrar COMBATONG® 25 % por vía oral.

DOSIS:

Peso (Kg)	Dosis en caso de Parásitos gastrointestinales, pulmonares y tenias (5 mg/Kg de peso vivo)	Fasciola hepática (10 mg/Kg de peso vivo
25	0.5 mL	1 mL
50	1 mL	6 mL
100	2 mL	10 mL
200	4 mL	20 mL
300	6 mL	30 mL
400	8 mL	40 mL

TIEMPO DE RETIRO:

- **Carne:** 15 días antes del sacrificio.
- **Leche:** 10 días.

RECOMENDACIONES:

- Conservar el producto fuera del alcance de los niños.
- Conservar el producto en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa.

PRESENTACIONES:

Frasco 30, 250, 500 mL y 1 L.