

Ficha Técnica**ENRO TONG® Solución Inyectable**

Reg. Senasa F.03.01.N.0951

DESCRIPCIÓN:

ENRO TONG® posee la rápida y potente acción bactericida de la enrofloxacin como resultado de la inhibición de la enzima DNA girasa, esencial en la replicación del DNA bacteriano. ENRO TONG® se distribuye en todos los tejidos sujetos a infección.

COMPOSICIÓN:

Cada 100 ml de solución contienen:
Enrofloxacin 5 g, Vehículo estéril c.s.p. 100 ml.

INDICACIONES:

ENRO TONG® está indicado en el tratamiento contra infecciones de los bovinos, porcinos, caprinos, ovinos, camélidos sudamericanos, caninos, felinos y aves ocasionadas por bacterias gram-negativas, gram-positivas y micoplasmas sensibles a la enrofloxacin;

Bovinos, Porcinos, Caprinos, Ovinos, Camélidos: Infecciones digestivas (diarreas), infecciones respiratorias (neumonías y rinitis), mastitis, infecciones genitourinarias y del ombligo, MMA (metritis, mastitis y agalactia), infecciones del caso o pezuñas (pododermatitis), infecciones septicémicas causadas por: E. coli; *Salmonella* spp; *Erysipelothrix rhusiopathiae*; *Staphylococcus* spp. e infecciones de la piel.

Caninos y Felinos: Infecciones dermatológicas o piodermitis, infecciones respiratorias (neumonías y bronconeumonías), infecciones del conducto auditivo y otitis, infecciones genito-urinarias, infecciones gastrointestinales y también en casos de Ehrlichiosis.

Aves: Infecciones respiratorias (moquillo, coriza) causadas por E. coli, *Haemophilus* spp., Mycoplasmas, septicemias causadas por *Pseudomonas* spp., *Staphylococcus* spp., *Pasteurella* spp (cólera aviar), colibacilosis, salmonelosis (paratifoidea, tifoidea, salpingitis, pullorosis) y en tratamientos secundarios de enfermedades como Newcastle y Bronquitis.

Conejos y Cuyes: Septicemias (otitis) causadas por *Pasteurella* spp., *Streptococcus* spp, *Staphylococcus*, *Malasezzia*, *Pseudomonas* y E. coli entre otros.

ADMINISTRACIÓN:

Administrar ENRO TONG® por vía intramuscular o subcutánea.

DOSIS:

- **Bovinos, Camélidos, Porcinos, Ovinos y Caprinos:** 1 ml para 20 kg. por 3 - 5 días.
- **Caninos, Felinos, Aves, Conejos y Cuyes:** 1 ml para 10 kg. por 3 - 5 días.

TIEMPO DE RETIRO:

- Carne: 7 días
- No administrar a animales cuya leche es destinada a consumo humano.
- No administrar a ponedoras cuyos huevos se destinan a consumo humano.

RECOMENDACIONES:

- Conservar el producto fuera del alcance de los niños.
- Conservar el producto en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa.

PRESENTACIONES:

Frasco ampolla de 10, 20, 50, 100 y 250 ml.

