



Reconstituyente

Ficha Técnica

HIERRO-DEX[®] Solución Inyectable

Reg. Senasa F.75.01.N.0160

DESCRIPCIÓN:

HIERRO-DEX[®] es una solución estéril de hierro dextrano y vitamina B12, específicos para el tratamiento de anemias, y de una forma especial la ferropénica de los lechones, motivada por una carencia del elemento hierro, dado que la leche materna no suministra las cantidades que necesita el lechón para su normal desarrollo y para formar hemoglobina. HIERRO-DEX[®] previene y cura la anemia ferropénica de los lechones y de los animales en general, aumenta las defensas orgánicas contra las infecciones, acelera el índice de crecimiento y mejora su desarrollo.

COMPOSICIÓN:

Cada 100 ml contiene:
Complejo Hierro Dextrano 100 mg., Vitamina B12 (cianocobalamina) 20 µg., Vehículo acuoso c.s.p. 100 mL.

INDICACIONES:

Indicado en Porcinos, Bovinos y Ovinos para la prevención y tratamiento de anemias hipocrómicas por falta de hierro; principalmente la anemia ferropénica de los lechones. En la gestación, en las convalecencias, piroplasmosis y anaplasmosis de los bovinos y, en general, como tónico reconstituyente.

ADMINISTRACIÓN:

Administrar HIERRO-DEX[®] por vía intramuscular profunda.

DOSIS:

- **Lechones:**
 - **Prevención:** entre el 1º y 4º día de edad, administrar 1mL de HIERRO-DEX[®]. Si es necesario, puede repetirse la dosis a los 15 días de edad.
 - **Tratamiento:** 2 ml de HIERRO-DEX[®]. Si es necesario, repetir dosis a los 7 días.
- **Bovinos y Ovinos:** 2 a 4 mL de HIERRO-DEX[®], dosis única.

SOBREDOSIS:

Una administración indiscriminada puede producir un almacenamiento patológico de hierro que puede resultar mortal y se manifiesta clínicamente con postración y debilidad muscular. Para su tratamiento se recomienda el uso de quelantes o absorbentes de hierro.

CONTRAINDICACIONES:

- No administrar a animales con historial de hipersensibilidad al hierro dextrano.
- En anemias de tipo infeccioso
- En animales con deficiencia de vitamina E y/o selenio (puede ocasionar la muerte).

EFFECTOS SECUNDARIOS:

- Coloración en el punto de inyección
- Puede producirse una reacción local
- Pueden aparecer reacciones de hipersensibilidad

RECOMENDACIONES:

- Desinfectar previamente la zona de inyección.
- Conservar el producto fuera del alcance de los niños.
- Conservar el producto en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa.

PRESENTACIONES:

Frascos de 10 y 20 mL

