BIOTONG

Antihistamínico

Ficha Técnica

HISTA TONG® Solución Inyectable

Reg. Senasa F.05.01.N.0015

DESCRIPCIÓN:

Dentro de las enfermedades de los animales hay una variedad de procesos denominados alérgicos ó alergias que definen un estado especial de hipersensibilidad por el cual el individuo reacciona de un modo alterado a la administración de una sustancia medicamentosa o de cualquier otra índole. Los procesos alérgicos afectan a los diferentes órganos y tejidos y se manifiestan con la sintomatología más variada, que puede ir desde una simple urticaria hasta el shock y muerte.
HISTA TONG® tiene como principio activo un antihistamínico potente y de amplio espectro, efectivo para reducir y eliminar cualquier reacción alérgica. También tiene acción preventiva, por lo cual es aconsejable su empleo cuando se prevé una reacción de este tipo. Administrado en las dosis que se indica, HISTA TONG® es inocuo y casi por completo carente de reacciones secundarias, lo que permite su empleo cada vez que sea necesario.

COMPOSICIÓN:

Cada 100 ml de solución contienen:
Maleato de Clorfeniramina 1 g., Excipientes c.s.p. 100 ml.

INDICACIONES:

Indicado en el tratamiento de las manifestaciones alérgicas de cualquier etiología y localización de equinos, bovinos, camélidos, ovinos, caprinos, porcinos, caninos y felinos:

- En el tratamiento y prevención del ***Shock Anafiláctico*** por intolerancia a los antibacterianos y vacunas.
- Dermatitis alérgicas causadas por intoxicaciones alimenticias o reacciones adversas a la aplicación de determinado medicamento.
- Infosura equina, asma de tipo alérgico, nefritis agudas, asma bronquial, rinitis.
- Por su acción antiespasmódica sobre la musculatura lisa actúa en ciertos cólicos de los equinos, en ciertos meteorismos de los rumiantes.
- Como coadyuvante por su poder antitóxico en metritis cuyo origen sea la retención placentaria.
- En el tratamiento de picaduras y aguijones de insectos, prurito de origen desconocido, urticaria, irritación cutánea.
- Tratamiento de apoyo para la mastitis, laminitis y envenenamiento.

ADMINISTRACIÓN:

Administrar HISTA TONG® por vía intramuscular, subcutánea y endovenosa lenta.

DOSIS:

- **Bovinos y Equinos:** 1 ml por 50 kpv/día, 2 a 3 veces al día.
- **Camélidos, Porcinos, Ovinos, Caprinos, Caninos y Felinos:** 0.1 ml. por 5 kpv/día, 2 a 3 veces al día.

TIEMPO DE RETIRO:

- Carne: 7 días antes del sacrificio.
- Leche: 2 días antes de su consumo.

RECOMENDACIONES:

- Conservar el producto fuera del alcance de los niños.
- Conservar el producto en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa.

PRESENTACIONES:

Frasco ampolla de 20, 50 y 100 mL.