



Antiparasitario  
Interno y Externo

Ficha Técnica

## IVERMI TONG® Solución Inyectable

Reg. Senasa F.009.001.N.00425

<b>DESCRIPCIÓN:</b>	IVERMI TONG® Solución Inyectable es un antiparasitario que proporciona un control eficaz de los parásitos internos y externos de bovinos, ovinos, caprinos y porcinos. La Ivermectina estimula la liberación del ácido gamma-aminobutírico (GABA) en el parásito que inhibe la transmisión de impulsos motores provocando su parálisis y muerte.
<b>COMPOSICIÓN:</b>	Cada ml. contiene: Ivermectina 10 mg., Excipientes c.s.p. 1 ml.
<b>INDICACIONES:</b>	<p>IVERMI TONG® Solución Inyectable está indicado para el tratamiento y control de parasitosis internas y externas en:</p> <p><b>Bovinos:</b> <u>Gusanos gastrointestinales:</u> Haemonchus spp., Otertagia spp., Trichostrongylus spp., Cooperia spp., Bunostomum spp., Oesophagostomum spp., Nematodirus spp., Strongyloides spp., Toxocara spp., Trichuris spp., Parafilaria spp., Thelazia spp. <u>Gusanos pulmonares:</u> Dictyocaulus spp. <u>Moscas de Miasis:</u> larvas de Dermatobia spp., Hypoderma spp. <u>Piojos:</u> Haematopinus spp., Linognathus spp., Damalinia spp. <u>Ácaros:</u> Psoroptes ovis, Sarcoptes scabiei var. bovis, Chorioptes bovis. <u>Garrapatas:</u> Boophilus microplus.</p> <p><b>Ovinos y Caprinos:</b> <u>Gusanos redondos y gastrointestinales:</u> Haemonchus spp., Ostertagia spp., Trichostrongylus spp., Nematodirus spp., Cooperia spp., Oesophagostomum spp., Chabertia spp., Trichuris spp., Strongyloides spp. <u>Gusanos pulmonares:</u> Dictyocaulus spp. <u>Bicho da cabeza:</u> Oestrus ovis. <u>Ácaros de la sarna:</u> Psoroptes communis var. ovis, Sarcoptes scabiei (son necesarias dos inyecciones con intervalo de 7 días para la total eliminación de ácaros vivos).</p> <p><b>Porcinos:</b> <u>Gusanos Gastrointestinales:</u> Ascaris suum, Strongyloides ransomi (en cerdas, 7 a 14 días antes del parto, controla la transmisión por medio de la leche a los lechones). <u>Gusanos pulmonares:</u> Metastrongylus spp. <u>Gusanos renales:</u> Stephanurus dentatus. <u>Piojos:</u> Haematopinus suis. <u>Ácaros de sarna:</u> Sarcoptes scabiei var. suis.</p>
<b>ADMINISTRACIÓN:</b>	Administrar IVERMI TONG® Solución Inyectable por vía subcutánea.
<b>DOSIS:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Bovinos, Ovinos y Caprinos:</b> 1 ml por cada 50 Kg. de peso vivo.</li><li>- <b>Porcinos:</b> 1 ml por cada 33 Kg. de peso vivo.</li></ul>
<b>TIEMPO DE RETIRO:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Bovinos:</b> 35 días antes del sacrificio.</li><li>- <b>Ovinos y Caprinos:</b> 28 días antes del sacrificio.</li><li>- <b>Porcinos:</b> 18 días antes del sacrificio.</li><li>- No usar en hembras lecheras, cuya leche se destine al consumo humano.</li></ul>
<b>RECOMENDACIONES:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Conservar el producto fuera del alcance de los niños.</li><li>- Conservar el producto en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa.</li></ul>
<b>PRESENTACIONES:</b>	Frasco ampolla de 10, 20, 50 y 100 ml.

