



Antibiótico

Ficha Técnica

TILOTONG FORTE® Solución Inyectable

Reg. Senasa F.03.01.N.1333

DESCRIPCIÓN:

TILOTONG FORTE® es una potente asociación antibiótica y antihistamínica específica en el tratamiento de infecciones bacterianas ocasionadas por agentes sensibles a sus componentes incluyendo procesos alérgicos. TILOTONG FORTE® tiene gran actividad y amplio espectro obteniendo un efecto sinérgico de rápida distribución y eficacia. La asociación de Tilosina y Gentamicina repercute en el beneficio de los animales enfermos y en el menor costo de tratamiento para el propietario ya que puede administrarse menos volumen de medicamento por un tiempo mas corto.

COMPOSICIÓN:

Cada 100 ml de solución contienen:
Tilosina Tartrato 15 g, Gentamicina Sulfato 6 g, Clorfenamina maleato 0.750 g., Vehículo estéril c.s.p. 100 ml.

INDICACIONES:

TILOTONG FORTE® es un antibiótico indicado para el tratamiento de enfermedades en bovinos, porcinos, caprinos, ovinos, camélidos sudamericanos, caninos, felinos y aves como:

- **Bovinos, Camélidos, Ovinos y Caprinos:** Infecciones respiratorias como neumonías y bronconeumonías, mastitis, pederia, endometritis, artritis, septicemias, infecciones oculares; en la prevención de cetosis bovina, shock y stress.
- **Porcinos:** neumonías, pleuroneumonía, artritis, erisipela, disentería porcina, salmonelosis, septicemias, colibacilosis, etc.
- **Aves:** coriza, enfermedad respiratoria crónica, salmonelosis, colibacilosis, enteritis necrótica, etc.
- **Caninos y Felinos:** infecciones urogenitales, neumonías, traqueitis, infecciones cutáneas y gastrointestinales en general.
- La inclusión de clorfenamina, colabora en la resolución de los síntomas derivados de los procesos alérgicos, asociados a reacciones de hipersensibilidad mediadas por histamina, concurrentes a numerosos procesos infecciosos.

ADMINISTRACIÓN:

Administrar TILOTONG FORTE® por vía intramuscular profunda.

DOSIS:

- **Bovinos, Camélidos sudamericanos, Porcinos, Ovinos y Caprinos:** 1 ml por 15 kp/día, durante 3 días consecutivos.
- **Caninos, Felinos y Aves:** 1 ml. por 5 kp/día, durante 3 días consecutivos.

TIEMPO DE RETIRO:

- Carne: 30 días
- Leche: 3 días

RECOMENDACIONES:

- Conservar el producto fuera del alcance de los niños.
- Conservar el producto en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa.

PRESENTACIONES:

Frasco ampolla de 50, 100 y 250 ml.



