BIOTONG

Antibiótico

**Ficha Técnica**

# TILO TONG® Polvo soluble

Reg. Senasa F.03.26.N.1264

**DESCRIPCIÓN:**

TILO TONG® es una potente asociación antibiótica de gran actividad bactericida y de amplio espectro, que combina la asociación de Tilosina, Estreptomicina y Tetraciclina obteniendo un efecto sinérgico de rápida distribución y de elevada eficacia. Por su rápida respuesta TILO TONG permite un rápido control de las enfermedades causadas por gérmenes sensibles a sus principios activos.

**COMPOSICIÓN:**

Cada 100 gramos contienen:
Tartrato de Tilosina 6 g, Estreptomicina Sulfato 6 g, Tetraciclina HCL 5 g, Excipientes c.s.p. 100 gr

**INDICACIONES:**

TILO TONG® es un antibiótico de amplio espectro indicado para el tratamiento infecciones producidas por gérmenes sensibles a sus componentes en:

- **Bovinos, Ovinos y Caprinos:** Neumonía, mastitis, metritis, septicemia hemorrágica, leptospiras, edema maligno. Vibriosis bovina, carbón sintomático y bacteridiano (Antrax), e infecciones en general.
- **Porcinos:** Enteritis bacteriana (diarreas), infecciones del tracto respiratorio e infecciones en general como Erisipela, Salmonelosis, Colibacilosis, Disenteria y Artritis.
- **Aves:** Enfermedad respiratoria crónica, coriza infeccioso, colera aviar, micoplasmosis (Moquillo) sinusitis, sinovitis, control de infecciones asociadas con virus, diarreas bacterianas ocasionadas por Salmonella y E. coli.

**ADMINISTRACIÓN:**

Administrar TILO TONG® por vía oral en el agua de bebida o mezclado en el alimento. El agua debe ser preparada diariamente.

**DOSIS:**

- **Preventiva:**
  - Bovinos 2.5 g por cada 50 kpv/día, por 3 a 5 días.
  - Porcinos, Ovinos y Caprinos: 1 sobre para 50 litros de agua por 7 días.
  - Aves: 1 sobre para 12 litros de agua por 3 a 5 días.

**TIEMPO DE RETIRO:**

- No administrar durante 30 días antes del sacrificio de los animales destinados a consumo humano.
- No consumir leche durante los 7 días siguientes al tratamiento.

**RECOMENDACIONES:**

- Conservar el producto fuera del alcance de los niños.
- Conservar el producto en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa.

**PRESENTACIONES:**

Caja dispensadora de 25 sobres de 10 gramos cada uno y sobre de 100 gr.