BIOTONG

Vacunas

Ficha Técnica

TRIPLETONG® Bacterina Triple

Reg. Senasa B.01.4.07.N.1196

DESCRIPCIÓN:	Los clostridios constituyen un grupo de bacterias altamente patógenas que liberan toxinas letales para los animales y el hombre. Se les localiza en el suelo formando esporas o incluso en el contenido intestinal, como parte de la flora bacteriana. Estos pueden ser adquiridos por contaminación de heridas por castración, descorne, corte de cola, traumatismos musculares o mediante la ingestión a través del agua o alimentos contaminados. Las pasteurellas son habitantes normales del tracto respiratorio y pueden incrementar su desarrollo en situaciones de mala nutrición, estrés, condiciones climáticas adversas y transporte. TRIPLETONG® es una bacterina utilizada para la prevención y control del Carbunco Sintomático, Edema Maligno y Septicemia Hemorrágica, ocasionados por Clostridium chauvoei, Clostridium septicum y Pasteurella multocida respectivamente.
VENTAJAS:	-Es compatible con tratamientos de desparasitación, orales o inyectados. -Puede aplicarse en hembras en el último tercio de gestación, confiriendo así protección activa a la cría en los primeros meses de vida. -Está certificada por el Senasa; pues reúne todos los controles exigidos por la autoridad sanitaria de potencia, inocuidad y esterilidad.
COMPOSICIÓN:	Cultivos puros de *Clostridium chauvoei* 60 %, de *Clostridium septicum* 20 % y de *Pasteurella multocida* 20 %.
INDICACIONES:	TRIPLETONG® está indicado en la prevención de Carbunco Sintomático o pierna negra, Edema Maligno o gangrena gaseosa y Septicemia Hemorrágica en bovinos y ovinos. TRIPLETONG® debe ser aplicado partir de los 3 meses de edad, edad donde no hay interferencia con los anticuerpos maternos. La revacunación debe realizarse cada 12 meses.
ADMINISTRACIÓN:	Administrar TRIPLETONG® por vía subcutánea en la tabla del cuello.
DOSIS:	- **Bovinos:** 5 mL - **Ovinos:** 3 mL
DURACIÓN DE LA INMUNIDAD:	La inmunidad se establece a los 7 días de aplicada la vacuna y dura aproximadamente 12 meses. Sin embargo, en zonas endémicas o donde la enfermedad es prevalente, deberá revacunarse cada 6 meses.
PRECAUCIONES:	- Animales enfermos, desnutridos o en estado febril no deben vacunarse. - Utilizar siempre material estéril (agujas y jeringas). - El envase junto con los restos de vacuna deben quemarse completamente. - Consérvese en refrigeración entre 3 y 7° C. - Manténgase fuera del alcance de los niños.
PRESENTACIONES:	Frasco ampolla de 20, 100 y 250 mL.