BIOTONG

Antiparasitario Interno

Ficha Técnica

TRIVERTONG Suspensión Oral

Reg. Senasa F.09.02.N.0348

DESCRIPCIÓN:	TRIVERTONG Suspensión Oral, es un antiparasitario de amplio espectro en vacunos, ovinos y equinos, útil en el control y tratamiento de Infestaciones producidas por: Gusanos redondos gastrointestinales, Gusanos redondos pulmonares (Dictycaulus viviparus), Gusanos planos (tenias), Fasciola hepática (Alicuya). Nemátodes gastroentéricos y pulmonares adultos e inmaduros. Parásitos externos: Larvas de Dermatobia hominis (Tupe), Hypoderma spp., Cochliomyia hominivorax. Piojos: Haematopinus eurysternus, Haematopinus suis, Linognathus vituli, Damalinia bovis, Solenopotes capillatus y Micorothorcis cameli. Ácaros de la sarna: Psoroptes bovis, Chorioptes Bovis, Sarcoptes scabiei var, Bovis Sarcoptes scabiei var suis. Garrapatas: Boophilus microplus. Distomatosis hepática subaguda, aguda y crónica, provocado por la Fasciola hepática (Alicuya o Saguaypie). Puede ser utilizado como preventivo de bicheras en castración de terneros.
COMPOSICIÓN:	Cada 100 ml contiene: Triclabendazole 12 g , Febendazole 10 g, Ivermectina 0.2 g., Excipientes c.s.p. 100 ml
INDICACIONES:	TRIVERTONG, su uso está indicado en el control y tratamiento simultáneo de parasitosis externa e interna, y principalmente en los casos de fasciolasis aguda, subaguda y crónica en sus fases adultas e inmaduras, pero no es ovicida.
ADMINISTRACIÓN:	Administrar TRIVERTONG por vía oral.
DOSIS:	1 ml por cada 10 Kg de peso vivo en Bovinos, Ovinos y Equinos.
TIEMPO DE RETIRO:	- Carne: 28 días antes del sacrificio (Bovinos y Ovinos) - No administrar a animales en lactación cuando la leche sea para consumo humano. - No administrar dentro de los 28 días antes del parto.
RECOMENDACIONES:	- Trivertong está indicado para vacunos, ovinos, y equinos; puede administrarse en animales de cualquier edad y en cualquier fase de producción sea lactación, gestación o engorde, no tiene efectos embriotóxicos ni terarogénicos, puede administrarse en animales preñados. No se recomienda su uso en animales debilitados, muy parasitados o, en simultáneo con otras medicaciones, baños o vacunaciones. Agítese antes de usar. Manténgase fuera del alcance de los niños.
PRESENTACIONES:	Frasco 30, 250, 500 mL y 1 L.