

TRIPLETONG® Bacterina Triple**DESCRIPCIÓN:**

Los clostridios constituyen un grupo de bacterias altamente patógenas que liberan toxinas letales para los animales y el hombre. Se les localiza en el suelo formando esporas o incluso en el contenido intestinal, como parte de la flora bacteriana. Estos pueden ser adquiridos por contaminación de heridas por castración, descorne, corte de cola, traumatismos musculares o mediante la ingestión a través del agua o alimentos contaminados. Las pasteurellas son habitantes normales del tracto respiratorio y pueden incrementar su desarrollo en situaciones de mala nutrición, estrés, condiciones climáticas adversas y transporte. TRIPLETONG® es una bacterina utilizada para la prevención y control del Carbunco Sintomático, Edema Maligno y Septicemia Hemorrágica, ocasionados por *Clostridium chauvoei*, *Clostridium septicum* y *Pasteurella multocida* respectivamente.

VENTAJAS:

- Es compatible con tratamientos de desparasitación, orales o inyectados.
- Puede aplicarse en hembras en el último tercio de gestación, confiriendo así protección activa a la cría en los primeros meses de vida.
- Está certificada por el Senasa; pues reúne todos los controles exigidos por la autoridad sanitaria de potencia, inocuidad y esterilidad.

COMPOSICIÓN:

Cultivos puros de *Clostridium chauvoei* 60 %, de *Clostridium septicum* 20 % y de *Pasteurella multocida* 20 %.

INDICACIONES:

TRIPLETONG® está indicado en la prevención y control de Carbunco Sintomático o pierna negra, Edema Maligno o gangrena gaseosa y Septicemia Hemorrágica en bovinos y ovinos.

TRIPLETONG® debe ser aplicado partir de los 3 meses de edad, edad donde no hay interferencia con los anticuerpos maternos. La revacunación debe realizarse cada 12 meses.

ADMINISTRACIÓN:

Administrar TRIPLETONG® por vía subcutánea en la tabla del cuello.

DOSIS:

- **Bovinos:** 5 mL
- **Ovinos:** 3 mL

DURACIÓN DE LA INMUNIDAD:

La inmunidad se establece a los 7 días de aplicada la vacuna y dura aproximadamente 12 meses. Sin embargo, en zonas endémicas o donde la enfermedad es prevalente, deberá revacunarse cada 6 meses.

PRECAUCIONES:

- Animales enfermos, desnutridos o en estado febril no deben vacunarse.
- Utilizar siempre material estéril (agujas y jeringas).
- El envase junto con los restos de vacuna deben quemarse completamente.
- Consérvese en refrigeración entre 3 y 7° C.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIONES:

Frasco ampolla de 50, 100 y 250 mL.

